

おくすり^{せつめい}説明シート (胃腸薬^{いちょうやく})

おくすり^{くすり} 名まえ^{なまえ}
お薬の名前 :

の^の 飲み方^{かた} :

いちにち^{いちにち}
一日

かい^{かい}
回

こ^こ
個

ずつ、(食前^{しょくぜん}・食後^{しょくご}・他^た)
にお飲み下さい。

やく^{やく}
約

にちぶん^{にちぶん} かいぶん^{かいぶん}
(日分、回分) です。

い^い か^か じ^じ る^る し^し しょうじょう^{しょうじょう} き^き め^め
*以下の○印の症状に効き目があります。



いた^{いた}
おなかが痛い、



い^い
胃もたれ、



しょくよくぶしん^{しょくよくぶしん}
食欲不振、



べんひ^{べんひ}
便秘



げり^{げり}
下痢



は^は け^け
吐き気

た^た
その他

ちゅうい^{ちゅうい}
*注意事項

ちやくしゃにっこう^{ちやくしゃにっこう} あ^あ たら^{たら} ない^{ない} ずず^{ずず} しい^{しい} とこ^{とこ}ろ^ろに^に ぼくあ^{ぼくあ}ん^ん して^{して} くだ^{くだ}さい^{さい}。

つぎ^{つぎ} しょうじょう^{しょうじょう} み^み たら^{たら} たら^{たら}、 しょう^{しょう} を^を ちゅうし^{ちゅうし} して^{して} くだ^{くだ}さい^{さい}。

(発疹^{はっしん}、かゆみ、めまい、せきがひどくなる、その他^た)

そ^そ の^の 他^た 以^い 下^か の^こ 事^じ に^に ご^ご 注^{ちゅう} 意^い 下^{くだ} さい^{さい}。

- ・
- ・

くすり^{くすり} を^を 2~3日^{にちの} 飲^{しょうじょう} ん^{なお} で^で も^も 症^{はや} 状^{びょういん} が^{いいん} 治^{しんさつ} ら^う ない^う と^う き^う は、お早^{はや} め^め に^に 病^{びょういん} 院^{いん} ・医^{いいん} 院^{いん} の^{しんさつ} 診^う 察^う を^う 受^う けて^う
くだ^{くだ} さい^{さい}。